

Adiós al mareo durante el viaje.



NUEVO
COMPRIMIDOS DE
160 MG

DOSIS DE 8MG/KG
PARA LA PREVENCIÓN
DEL VÓMITO DEBIDO AL
MAREO POR VIAJES



Salud Animal

Mareo debido a viajes
Cerenia[®]
LIBERTAD PARA VIAJAR

El mareo en perros debido a los viajes es una afección clínica para la que, hasta ahora, no se disponía de un tratamiento médico-veterinario adecuado.

>17%'

de los perros sufren mareo durante los viajes

sólo un 3%

de los propietarios cuyos perros se marean acuden o consultan a su veterinario

Hasta la fecha las opciones de tratamiento han sido limitadas e insatisfactorias

- Los sedantes (p.e. acepromacina) producen somnolencia en el perro durante varias horas
- El acostumar al animal a los viajes requiere una gran inversión de tiempo y puede resultar incómodo para los dueños de los perros
- Dejar al perro en casa o en residencias es frustrante para los dueños y desagradable para sus mascotas
- Otra solución es que los dueños de las mascotas simplemente continúen resignándose a las consecuencias

El mareo en perros debido a viajes no se trata suficientemente



El mareo en perros al viajar, supone también un problema sin resolver para el propietario y su mascota.

El mareo puede originarse en cualquier tipo de viaje

- Coche
- Tren
- Avión
- Barco

Está relacionado con

- La estimulación del oído interno
- Situaciones de estrés

Provocando los siguientes síntomas clínicos

- Ansiedad
- Inquietud
- Hipersalivación
- Náuseas

Incluidos los VÓMITOS

El mareo en perros durante los viajes pone a prueba la relación entre la familia y su mascota

- Restringe la libertad para viajar
- Obliga a los propietarios a no llevar consigo a sus mascotas
- Produce la frustración del dueño




AHORA

Hay una solución adecuada para la prevención del mareo con éxito – pudiendo reforzar así la relación entre el veterinario, el cliente y su mascota

Cerenia® - resuelve el problema gracias a su modo de acción único.

Cerenia® es el primer y único antagonista de los receptores NK-1 especialmente desarrollado para prevenir los vómitos originados por el mareo de los perros debido a los viajes

- El mareo se origina por fuertes estímulos eméticos centrales y estímulos relacionados con el aparato vestibular
- El reflejo del vómito se activa en los receptores NK-1 de la vía central emética
- Cerenia® se une fuertemente los receptores NK-1 bloqueando la activación del reflejo del vómito



Ampliamente instaurado en el tratamiento del vómito general:


**Grado de satisfacción
> 8/10²
en más de
7.500 casos
clínicos***

*independientemente de la causa o la duración de los vómitos (comprobado en estudios por veterinarios y dueños)

Cerenia® - eficacia comprobada en la prevención del mareo de los perros en el viaje.

Los estudios muestran que Cerenia® previene el vómito en más del 93% de los pacientes

- Tres extensos estudios clínicos controlados con placebo:
Un total de 374 perros con un historial de mareo durante los viajes.
- Diseño del estudio:
Placebo o Cerenia® administrado oralmente a una dosis de 8 mg/kg una sola vez, 1,2 ó 10 horas antes de un viaje de hasta 2 horas de duración.



El efecto antiemético de Cerenia® persiste durante al menos 12 horas.



Por tanto, Cerenia® puede ser administrado de 1 a 10 horas antes de partir, permitiendo la flexibilidad de administrarlo la noche antes de viajar o por la mañana temprano.

*Diferencia frente a placebo estadísticamente significativa

Mareo debido a viajes
Cerenia®
LIBERTAD PARA VIAJAR

Cerenia[®], seguro y bien tolerado para el mareo debido a viajes.

Seguridad comprobada en la clínica diaria

En estudios clínicos controlados con placebo^{3,4,5,6,7}, la seguridad fue evaluada en 276 perros tratados con Cerenia[®], con una amplia variedad de edades, razas, enfermedades y medicaciones concomitantes:

- No se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa en relación a los efectos adversos totales entre los grupos de placebo y Cerenia[®].*

Seguridad comprobada a dosis elevadas


En un estudio⁸ que incluía perros de edades entre 11 y 25 semanas, se administró, Cerenia[®] una vez al día a dosis de 30 mg/kg durante 7 días consecutivos

- ➔ más de 3 veces la dosis para mareo (8mg/kg)



> 3 veces la dosis para mareo

- ➔ más de 3 veces la duración máxima de tratamiento (2 días)



- No se observó ningún efecto adverso significativo o prolongado.

* Se observaron vómitos después de la administración de Cerenia[®] (antes del viaje) en un pequeño número de perros.

Esto puede controlarse evitando dejar en ayunas al perro antes del viaje, administrándole una comida ligera o un aperitivo antes de la toma de Cerenia[®] 9



Cerenia[®] ha demostrado seguridad y buena tolerancia en la clínica diaria.

Restablecer la libertad del propietario para viajar con su perro es ahora más fácil.

Tratamiento flexible y seguro para cualquier tipo de viaje

- Una sola dosis una hora antes del viaje, hace posible prevenir el vómito debido al mareo prácticamente todo el día (12 horas)
- Proporciona a los dueños de la mascota la flexibilidad de viajar con su perro cuando ellos quieran
- No deja adormecido o somnoliento al perro

Cerenia® permite a las mascotas y a sus dueños disfrutar juntos en más lugares y durante más tiempo.



Sus clientes pueden beneficiarse de Cerenia®, un tratamiento nuevo y efectivo para prevenir el mareo en perros

- **Enseñe** a su equipo cómo identificar a los pacientes que se marean durante los viajes
- **Informe** a sus clientes sobre las ventajas de Cerenia®
- **Conciencie** sobre este problema y su solución en su centro veterinario

Sus clientes se lo agradecerán.

Mareo debido a viajes
Cerenia®
LIBERTAD PARA VIAJAR

Ahora todo el mundo puede disfrutar de los viajes familiares con Cerenia®.

- Eficacia comprobada para prevenir en perros el vómito debido al mareo en el viaje
- Libertad para viajar administrando una sola dosis
- Sin efecto sedante

1 Data on file. Pfizer Market Research 2006

2 Data on file. Pfizer EU Study 2007

3 H. A. Benchaoui, E. M. Siedek, V. A. De La Puente-Redondo, N. Tilt, T. G. Rowan, R. G. Clemence. Efficacy of maropitant for preventing vomiting associated with motion sickness in dogs. *Veterinary Record*; 161; 444-447, 2007.

4 Data on file. Pfizer Study 1963C-60-03-655

5 Data on file. Pfizer Study 1963C-60-04-689

6 Data on file. Pfizer Study 1963E-60-02-628

7 Data on file. Pfizer Study 5860C-85-01-246

8 Data on file. Pfizer Study 5462E-36-02-265

9 Data on file. Pfizer Study 5467R-50-04-293

Cerenia comprimidos para perros de 16, 24, 60 y 160 mg por comprimido de maropitant, como citrato de maropitant monohidrato. **Indicaciones:** prevención del vómito, incluyendo el inducido por quimioterapia, tratamiento del vómito, en combinación con **Cerenia Solución Inyectable** y con otras medidas complementarias y prevención del vómito inducido por mareos debidos a viajes. Nº de Registro: EU/2/06/062/001-002-003-004 **Cerenia solución inyectable** para perros 10 mg/ml de maropitant como citrato de maropitant monohidrato. **Indicaciones:** para la prevención del vómito, excepto los inducidos por mareo debido a movimiento y el tratamiento de este, en combinación con otras medidas complementarias. Nº de Registro: EU/2/06/062/005 (INYECTABLE) **Advertencias y precauciones:** Los vómitos pueden estar asociados con afecciones graves, muy debilitantes, incluyendo obstrucciones gastrointestinales, por lo tanto, debe evaluarse el diagnóstico apropiadamente. Se ha demostrado que **Cerenia comprimidos** es eficaz en el tratamiento de emesis, sin embargo, cuando los vómitos son muy frecuentes, Cerenia administrado por vía oral no puede absorberse antes de que tenga lugar el siguiente vómito. Por lo tanto, se recomienda iniciar el tratamiento de la emesis con Cerenia Solución para Inyección. La buena práctica veterinaria indica que los antieméticos deben usarse junto con otras medidas veterinarias y complementarias, tales como un control de la dieta y una terapia de reposición de fluidos mientras que se tratan las causas subyacentes de los vómitos. No se ha establecido la seguridad del medicamento veterinario en perros de menos de 16 semanas de edad. Debe usarse únicamente de acuerdo con una evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable. Maropitant se metaboliza en el hígado y, por lo tanto, debe usarse con precaución en pacientes con alteraciones hepáticas. Cerenia debe usarse con precaución en animales que padecen o tienen predisposición a enfermedades cardíacas, ya que maropitant tiene afinidad por los canales iónicos de Ca y K. Se observaron aumentos de aproximadamente un 10% en el intervalo QT del ECG en un estudio realizado en perros beagle sanos que recibieron 8 mg/kg; sin embargo, es poco probable que este aumento tenga significado clínico. Aunque se ha demostrado que Cerenia es eficaz tanto en el tratamiento como en la prevención de la emesis inducida por quimioterapia, se considera más eficaz cuando se usa de forma preventiva. Por lo tanto, se recomienda administrar el antiemético antes de la administración del agente quimioterapéutico. Lavarse las manos antes del uso. En caso de ingestión o inyección accidental buscar consejo médico inmediatamente y enseñar el prospecto o la etiqueta al médico. Medicamento veterinario sujeto a prescripción. No se recomienda el uso de **Cerenia solución inyectable** contra vómitos inducidos por mareo debido a movimiento. En estudios de laboratorio, se ha demostrado que maropitant puede ser un irritante de los ojos. En caso de exposición accidental a los ojos, lavar los ojos con una cantidad abundante de agua y buscar atención médica. Medicamento veterinario sujeto a prescripción. Pfizer SA. Avda de Europa 20-B. Parque empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid)



NUEVO
COMPRIMIDOS DE 160MG
DOSIS DE 8MG/KG
RECOMENDADA
PARA PREVENIR
EL VÓMITO POR
MAREO



Salud Animal

Mareo debido a viajes
Cerenia®
LIBERTAD PARA VIAJAR